患者さまへ

インスリン製剤等ご使用に際してのお願い

2008 年 10 月

日本イーライリリー株式会社

この度、インスリン製剤を複数の患者さまに使用された事例が報告されました。

従来からお願いしていることではありますが、「インスリン製剤」（キット製剤、カートリッジ製剤及びペン型注入器）及び「成長ホルモン製剤」（カートリッジ製剤及びペン型注入器）をお使いの患者さまにおかれましては、改めて以下の点にご注意いただきますようお願い申し上げます。

『１ 本の製剤を他人と共用しないでください』

１本の製剤を複数の患者さまで使用すると、毎回新しい針に取り替えた場合でも、カートリッジ内への血液混入（逆血）等により、感染の原因となるおそれがあります。

注入の前にインスリン製剤の状況を確認しましょう。変色したお薬は使用しないでください。
＊変色する原因として、血液成分がカートリッジ内に逆流して混入してしまうことなどが考えられます。

注入後は、注入ボタンを押したまま 5 秒以上待ち、押したまま注射針を抜いてください。
＊注射針が刺さった状態で、注入後にカートリッジ内の圧力が低くなると、血液がカートリッジ内に逆流します。
注入ボタンはまっすぐに、ゆっくりと押し、押したら 5 秒以上待ちましょう。

ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みくださいますようお願い申し上げます。

Lilly Answers リリーアンサーズ
日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口
（一般の方・患者様向け）
0120-245-970※1
078-242-3499※3
受付時間：月曜日～金曜日 8：45～17：30※2
※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
※2 祝祭日及び当社休日を除きます。
※3 フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、このお電話番号にお掛けください。
尚、通話料はお客様負担となります。

®：登録商標

〒651-0086 神戸市中央区磯上通 7-1-5